



Urząd Miejski w Rabce-Zdroju

https://gmina.rabka.pl/informator_turystyczny/aktualnosci_turystyczne/Uwaga-Zagrozenie-pryszczycy-FMD/idn:9772/printpdf

Drukuj grafikę : [tak](#) / [nie](#)

Aktualności turystyczne

09 kwi 2025

kategoria:

Aktualności



Uwaga! Zagrożenie pryszczycą (FMD)

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Targu

Na terenie Węgier, Słowacji i Niemiec wykryto ogniska pryszczycy (FMD) - wysoce zakaźnej choroby zwierząt parzystokopytnych (bydła, świnie, owiec, kóz, dzikich przeżuwaczy).

Zagrożenie rozprzestrzenienia się choroby na teren Polski jest realne!

Apelujemy o wzmożoną czujność, szczególnie wśród:

- hodowców i rolników
- pracowników skupów i transportu zwierząt
- służb terenowych


PRZYPOMINAMY:

- Pryszczycza nie zagraża ludziom, ale wywołuje poważne straty gospodarcze
- W przypadku jej wystąpienia obowiązują: zakaz przemieszczania zwierząt, kwarantanna, likwidacja stad

Wszelkie podejrzenia należy natychmiast zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Pryszczycza (FMD)


Choroba



Pryszczycza to choroba zwierząt parzystokopytnych udomowionych i wolno żyjących (w tym bydła, owiec, kóz, świń, wielbłądowatych, bawołów, jeleni). Powoduje powstawanie pęcherzy głównie w jamie ustnej i na kończynach. Objawy u zakażonych zwierząt: obfite ślinienie, mlaskanie, nadżerki i pęcherze, gorączka, spadek apetytu, niechęć do ruchu, kulawizna, spadek mleczności, ronienia.

U młodych zwierząt, np. prosiąt, jagniąt, kozłat, śmierć może wystąpić bez żadnych objawów.

Transmisja



Pryszczycza jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób. Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby, ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa. Możliwe jest przenoszenie wirusa wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt.

Może wystąpić przenoszenie drogą kropelkową (obecność wirusa w aerozolu).

Zapobieganie

Środek
dezynfekujący do
izolacji



Ryzykowne zachowania zwiększają prawdopodobieństwo zakażenia. Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym sposobem ochrony stada.

Ochrona stada w przypadku podejrzenia wystąpienia ognisk choroby w pobliżu:

Unikaj:

- kontaktów między zwierzętami z różnych stad, np. na pastwisku, przez ogrodzenie;
- zwiedzania innych miejsc, w których przebywają zwierzęta;
- korzystania ze wspólnych narzędzi, sprzętu, pojazdów, personelu z innymi gospodarstwami.

Stosuj:

- oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;
- odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;
- dezynfekcję obuwia przed wejściem do budynku ze zwierzętami

Szczepionki przeciwko pryszczycy są dostępne i muszą być stosowane wyłącznie z instrukcjami służb weterynaryjnych.

Świadomość



Choroba może powodować różne bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne. Bardzo ważne jest regularne sprawdzanie wszystkich zwierząt. Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej. Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby.



eo fmd
European Commission for the
control of foot and mouth disease



GŁÓWNY INSPEKTORAT
WETERYNARIJ

Redagował: Piotr Kuczaj

[poprzednia](#) [powrót do listy](#) **aktualności** [następna](#)